





山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k


林可霉素：本品用于骨髓炎治疗。对革兰氏阳性菌作用较强，对厌氧菌效果较好，口服适用于：葡萄球菌、化脓性链球菌、肺炎球菌及厌氧菌所致的呼吸道感染、皮肤软组织感染、女性生殖道及盆腔感染和厌氧菌所致的腹腔感染等。



吡利霉素：对革兰氏阳性菌作用较强，对厌氧菌效果较好



红霉素：对革兰氏阳性菌作用较强，对厌氧菌效果较好




阿维菌素对革兰氏阳性菌作用较强，对厌氧菌效果较好。白色或黄色结晶(含 B1a≥90%)，蒸气压 <200nPa，熔点 150— 155℃，21℃时溶解度在水中 7.8 微克/升、丙酮中 100、甲苯中 350、异丙醇 70，氯仿 25(g/L)常温下不易分解




山东绿都生物科技有限公司


Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k



多拉菌素：本品为白色或白色结晶性粉末，无臭，有引湿性。本品在氯仿、甲醇中溶解，在水中极微溶解。新型大环内酯类抗寄生虫药物，对线虫、昆虫和螨均具有高效驱杀作用。有高效，用量小，安全范围高的特点



泰乐菌素：泰乐菌素为一种白色板状结晶，微溶于水，呈碱性。产品有酒石酸盐、磷酸盐、盐酸盐、硫酸盐及乳酸盐，易溶于水。其水溶液在 25℃、pH5.5~7.5 时可保存 3 个月，但是若水溶液中含有铁、等金属离子时，会使本品失效。







山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

伊维菌素: 菌素广泛用于牛、羊、马、猪的胃肠道线虫、肺线虫和寄生节肢动物，犬的肠道线虫，耳螨、疥螨、心丝虫和微丝蚴，以及家禽胃肠线虫和体外寄生虫。



替米考星:由泰乐菌素的一种水解产物半合成的畜禽专用抗生素，药用其磷酸盐



泰妙菌素: 本品为白色或类白色结晶粉末，溶于甲醇和乙醇，在水中溶解，熔点为 143—149℃。

