FITC-小鼠抗猪IgM(μ链特异性)单克隆抗体 • 荧光素标记

荧光标记 • 抗猪IgM μ链特异性 • 高亲和力 FITC conjugated Monoclonal Mouse Anti-Pig IgM (μ-chain specific)

在您使用本产品前请认真阅读说明书，这对您顺利完成实验很有帮助。

产品名称

FITC-小鼠抗猪IgM(μ链特异性)

标记物浓度

以抗体计 1 mg/mL 左右

缓冲液成分

50% □□、0.01M PBS、0.5% BSA、N防腐剂 (CMIT/MIT/THYMOL)

有效期限

请查看管体标签，请在管体注明有效期内使用

推荐工作稀释比例

FLOW-CYT / IF

1:150 - 1:1,500

IHC

1:500 - 1:2,500

ELISA

可根据实验条件优化

使用建议： 本产品也可用于ELISA实验，请根据实验体系选择合适稀释比例。若工作液需长期存放或多次使用，建议分装冻存于 -20℃，避免反复冻融。

储存方法

建议避光存放在 **-20℃ ± 4℃**。避免反复冻融，分装保存可有效保持活性。

注意事项

虽然本试剂在有效期过后很长一段时间仍可使用，但还是强烈建议您在管体规定的有效期内正确使用。请不要在脏乱和强光环境中取用，以免造成污染和失效。如果一次使用很少可以将其适当分装后使用，这样可以有效防止试剂因为频繁使用而造成污染。

本试剂仅用于科学研究，不能直接用于诊断。

仅供科研使用 分装保存，避免反复冻融 使用前请短暂离心，避免甘油分层 适用于流式细胞、免

疫荧光、IHC 及 ELISA