HRP-鹅IgY • 辣根过氧化物酶标记

高比活性 • 稳定酶标抗体 • 多平台适用 HRP conjugated Goose IgY

在您使用本产品前请认真阅读说明书，这对您顺利完成实验很有帮助。

产品名称

HRP-鹅IgY / HRP-Goose IgY

标记物浓度

2 mg/mL 左右

缓冲液成分

50% □□、0.01M PBS、Proclin-300

有效期限

请查看管体标签，请您在管体注明有效期内使用

推荐工作稀释比例 & 使用建议

ELISA

1:4,000 - 1:12,000

WESTERN BLOT

1:4,000 - 1:12,000

拓展稀释

可数万倍后仍具使用价值

使用建议： ELISA，WB建议在1:4000-12000选择合适您实验的稀释比例，也可根据您实验的具体情况在此建议的稀释度范围之外合理使用。如果您使用得当，本产品可以稀释到数万倍后仍具有使用价值。

推荐稀释液： 含0.2% BSA（不能含有免疫球蛋白）和0.05%吐温-20的0.01M PBS（pH 7.0）。也可使用其它正确的稀释液，原则上配成的工作液要一次使用完。稀释后若需长期存放、多次使用，请添加合适的稳定剂，稳定剂若需要可联系我们购买。

关键提示：稀释液中的BSA务必确保不含免疫球蛋白，以免产生非特异性背景。

储存方法

建议避光存放在 -20℃ ± 4℃。请避免反复冻融，推荐分装成单次使用量保存，以保证长期活性稳定性。

注意事项 • 规范操作

虽然本试剂在有效期过后很长一段时间仍可以使用，但还是强烈建议您在管体规定的有效期内正确使用。请不要在脏乱和强光环境中取用，以免造成污染和失效。如果一次使用很少，可以将其适当分装后使用，这样可以有效的防止试剂因为频繁使用而造成污染。

请使用正确的稀释液，没有酶免基础知识的人员不得利用本产品做任何实验，否则可能得到错误结果。
本试剂仅用于科学研究，不能直接用于诊断。 严禁用于临床检测或人体相关应用。

仅供科研使用 分装保存，避免反复冻融 取用前轻摇并短暂离心，防止甘油层不均 HRP-Goose IgY | 高酶活性 稳定剂需求可咨询购买