# HRP-鹌鹑IgY • 辣根过氧化物酶标记

高酶活 • 高特异性 • 优异信噪比 HRP conjugated Quail IgY

在您使用本产品前请认真阅读说明书，这对您顺利完成实验很有帮助。

产品名称

HRP-鹌鹑IgY / HRP-Quail IgY

标记物浓度

2 mg/mL 左右

缓冲液成分

50% □□、0.01M PBS、Proclin-300

有效期限

请查看管体标签，请您在管体注明有效期内使用

## 推荐工作稀释比例 & 使用建议

ELISA

1:4,000 - 1:12,000

WESTERN BLOT

1:4,000 - 1:12,000

高稀释潜力

可稀释至数万倍仍具活性

**使用建议：** ELISA，WB建议在1:4000-12000选择合适您实验的稀释比例，也可根据您实验的具体情况在此建议的稀释度范围之外合理使用。如果您使用得当，本产品可以稀释到数万倍后仍具有使用价值。

**推荐稀释液：** 含0.2% BSA（不能含有免疫球蛋白）和0.05%吐温-20的0.01M PBS（pH 7.0）。也可使用其它正确的稀释液，原则上配成的工作液要一次使用完。稀释后若需长期存放、多次使用，请添加合适的稳定剂，稳定剂若需要可联系我们购买。

关键提示：稀释液中的BSA必须不含免疫球蛋白，避免交叉反应影响结果。

## 储存方法

建议避光存放在 -20℃ ± 4℃。请避免反复冻融，推荐分装成单次用量保存，以保证长期稳定性与酶活性。

## 注意事项 • 安全使用规范

虽然本试剂在有效期过后很长一段时间仍可以使用，但还是强烈建议您在管体规定的有效期内正确使用。请不要在脏乱和强光环境中取用，以免造成污染和失效。如果一次使用很少，可以将其适当分装后使用，这样可以有效的防止试剂因为频繁使用而造成污染。

请使用正确的稀释液，没有酶免基础知识的人员不得利用本产品做任何实验，否则可能得到错误结果。
**本试剂仅用于科学研究，不能直接用于诊断。** 严禁用于临床或人体应用。

仅供科研使用 分装保存，避免反复冻融 取用前短暂离心，避免甘油分层 HRP-Quail IgY | 高酶活标记 稳定剂相关需求可联系我们购买